Противопоказания к применению вакцин против COVID-19

(на основании временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19 № 30-4/И/2-9825)

Противопоказания для всех вакцин против COVID-19

1. Возраст до 18 лет.
2. Беременные женщины.
3. Кормящие матери.

ВАКЦИНА	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
• **Гам-КОВИД-Вак** • **Гам-КОВИД-Вак-Лио**	• Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; • Тяжелые аллергические реакции в анамнезе; • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваний ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации температуры; • Беременность и период грудного вскармливания; • Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).	• Хронические заболевания печени и почек; • Эндокринные заболевания (выраженные нарушения функций щитовидной железы и сахарный диабет в ст. декомпенсации); • Тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия и др. заболевания ЦНС; • Острый коронарный синдром; • Острое нарушение мозгового кровообращения; • Миокардиты, эндокардиты, перикардиты. **ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК** для пациентов (вследствии недостатка информации) • с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); • со злокачественными новообразованиями.

• **Гам-КОВИД-Вак** • **Гам-КОВИД-Вак-Лио (введение II компонента)**	• Тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 С и т. п.) на введение компонента I вакцины.	
• **ЭпиВакКорона**	• Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим); • Тяжелые формы аллергических заболеваний; • Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; • Иммунодефицит (первичный); • Злокачественные заболевания крови и новообразования; • Беременность и период грудного вскармливания; • Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).	• Хронические заболевания печени и почек; • Выраженные нарушения функции эндокринной системы; • Тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульты и др. заболевания ЦНС; • Заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ИБС); • Первичные и вторичные иммунодефициты; • Аутоиммунные заболевания; • Аллергические реакции. **Конкретное решение о необходимости проведения прививок больным с хроническими заболеваниями, злокачественными болезнями крови и новообразованиями и т. п. зависит от степени риска заболевания.**
• **ЭпиВакКорона (II доза)**	• Аллергическая реакция на I дозу.	

• **КовиВак**	• Серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе; • Отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.); • Беременность и период грудного вскармливания; • Возраст 18 лет; • Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания; • Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии.	• Хронические заболевания печени и почек; • Выраженные нарушения нейроэндокринной системы; • Тяжелые заболевания системы кроветворения; • Заболевания ЦНС (эпилепсия, инсульт и др.); • Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, миокардиты, эндокардиты, перикардиты); • Заболевания бронхолегочной системы (бронхиальной астма, ХОБЛ, фиброзирующий альвеолит и др.); • Заболевания ЖКТ (при синдроме мальабсорбции и т. п.); • Заболевания иммунной системы (при аутоиммунных и аллергических заболеваниях)
• **Спутник Лайт**	• Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; • Тяжелые аллергические реакции в анамнезе; • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ,	• Хронические заболевания печени и почек; • Эндокринные заболевания (выраженные нарушения функций щитовидной железы и сахарный диабет в ст. декомпенсации); • Тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсия и др. заболевания ЦНС; • Острый коронарный синдром; • Острое нарушение мозгового

	острых инфекционных заболеваниях ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации температуры; • Беременность и период грудного вскармливания; • Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)	кровообращения; • Миокардиты, эндокардиты, перикардиты. **ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК для пациентов**: • с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентами с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых жизнеугрожающих состояний); • со злокачественными новообразованиями.